



ACTINISCHE CHEILOSE

Kerninformatie actinische cheilose

- Actinische cheilose (ook wel: *actinische cheilitis*) is het gevolg van schade aan de lippen door langdurige blootstelling aan zonlicht.
- Door deze blootstelling zijn de delende cellen van het lippenrood veranderd en ontstaan korstjes of kleine open plekjes.
- Actinische cheilose wordt beschouwd als een voorstadium van plaveiselcelcarcinoom (een vorm van huidkanker)
- De arts zal in veel gevallen een biopt (klein stukje weefsel) willen afnemen om uit te sluiten dat er toch al een plaveiselcelcarcinoom is ontstaan.
- Actinische cheilose kan behandeld worden met 5-fluorouracil crème (Efudix) of fotodynamische therapie. Ook stikstof behandeling (bevriezing) is soms mogelijk, vooral bij kleine plekjes.
- Na behandeling zal periodiek een controle plaatsvinden omdat de onrustige plekjes kunnen terugkomen én omdat soms op termijn toch huidkanker kan ontstaan.
- Goede bescherming van de lippen tegen de zon is belangrijk

Lees de uitgebreide informatiefolder over actinische cheilose :

www.huidinfo.nl > [actinische cheilose](#)

Andere nuttige informatie :

www.huidinfo.nl > [plaveiselcelcarcinoom van de huid](#)